

Informacje dla pacjentów otrzymujących ruchome uzupełnienia protetyczne (protezy częściowe i całkowite)

Po otrzymaniu nowej protezy pacjent może odczuwać szereg przejściowych dolegliwości, które są naturalnym zjawiskiem związanym z obecnością w jamie ustnej ciała obcego, jakim jest proteza.

Nowa proteza może spowodować:

- wzrost lub spadek wydzielania śliny
- trudności w połykaniu pokarmów
- zniekształcenie mowy
- uczucie dyskomfortu
- uczucie braku miejsca dla języka
- nagryzanie policzków i/lub warg
- ucisk i otarcia

Dolegliwości te zwykle trwają od kilku godzin do kilku dni. Aby je wyeliminować, należy ćwiczyć głośne czytanie, recytację oraz dostosować dietę rezygnując z potraw bardzo twardych i wymagających długiego żucia.

Jama ustna jest wyścieloną miękką błoną śluzową podatną na różne urazy i otarcia (nawet przy pełnym użębieniu naturalnym twardy - np. suchary, może spowodować jej uszkodzenie). Proteza jest przedmiotem sztywnym, twardym i jej dopasowanie na miękkim podłożu, jakim jest błona śluzowa wymaga czasu i niejednokrotnie kilku wizyt adaptacyjnych.

Oddanie gotowej protezy to nie koniec wizyt związanych z jej wykonaniem!

Bardzo ważne są wizyty kontrolne, na których dokonuje się korekty protezy. Z tego powodu, jeżeli istnieją miejsca, w których ona uwiera, na kilka godzin przed taką wizytą należy założyć protezę, aby na błonie śluzowej powstał ślad.

Umożliwi on lekarzowi korektę dokładnie tam, gdzie jest to konieczne. Takich wizyt może być nawet kilka. Jest to bardzo ważne, ponieważ jeżeli pacjent w tym pierwszym okresie zniechęci się i odrzuci protezę, to nigdy już z niej nie skorzysta, gdyż warunki w jamie ustnej wciąż ulegają zmianom.